

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению «ДиарГард»  
для нормализации процессов пищеварения и устранения диареи.

**I. Общие сведения**

1. «ДиарГард»- премикс кормовой для нормализации процессов пищеварения и устранения диареи.

2. «ДиарГард» представляет собой многокомпонентную смесь, содержащую смектит, метилсульфонилметан (МСМ), макро- и микроэлементы, органические кислоты (янтарная, лимонная), ароматизатор, подстластитель, глюкозу, динатриевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты ( Трилон Б).

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

В 1 кг продукта содержится: смектит-55-60%, метилсульфонилметан-4-5%, калия цитрат-3-4%, натрия цитрат-2-4%, натрия хлорид-5-9%, динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты-3-5%, янтарная кислота-1%, глюкоза- до 100%, подстластитель-0,5%, ароматизатор-0,05%.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих в Российской Федерации.

3. «ДиарГард» представляет собой порошок серовато-белого или серовато -желтого цвета со специфическим запахом. При растворении в воде образует суспензию.

4. Выпускают продукт расфасованной в металлизированные пакеты по 1 кг, пластиковые ведра по 5 и 7 кг, бумажные мешки по 15 и 25 кг.

Каждую упаковку маркируют на русском языке с указанием: наименования организации-производителя, его адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения добавки, ее состава и гарантированных показателей, срока и условий хранения, даты изготовления, массы нетто, номера партии, сведений о сертификации, и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в плотно закрытой таре производителя в хорошо вентилируемом, сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от -5 °C до +25 °C.

Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

Не использовать по истечению срока хранения.

**II. Биологические свойства**

5. Биологические свойства премикса «ДиарГард» обусловлены наличием веществ, входящих в состав.

Смектит обладает высокими сорбционными и ионообменными свойствами. Стабилизирует слизистый барьер ЖКТ, образует поливалентные связи с гликопротеидами слизи, увеличивает ее количество, улучшает цитопротекторные свойства (в отношении отрицательного действия ионов водорода соляной кислоты, желчных солей, микроорганизмов и их токсинов). Обладает селективными сорбционными свойствами, которые объясняются его дискоидно-кристаллической структурой; адсорбирует находящиеся в просвете ЖКТ бактерии, вирусы.

Метилсульфонилметан является источником серы и устраниет воспалительные процессы в ЖКТ, способствует регенерации слизистой, повышает уровень глутатиона, который является, в том числе, нейтрализатором токсинов. МСМ также эффективен против ряда паразитов желудочно-кишечного тракта.

Катионы солей участвуют в водно-солевом обмене, восполняя потерю солей при диарее и предотвращая потерю жидкости.

Трилон-Б обладает антимикробным действием и усиливает его у других препаратов.

Янтарная кислота и глюкоза улучшают энергетическое состояние организма.

**III. Порядок применения**

6. «ДиарГард» применяют для профилактики желудочно-кишечных заболеваний с синдромом диареи, а также с целью профилактики болезней органов пищеварения и стимуляции роста и развития молодняка сельскохозяйственных животных

7. Премикс дают

Телятам:

При слабых признаках диареи: 50 грамм разводят в 0,5-2 л теплой воды (молока, ЗЦМ). Выпаивают полученную суспензию дважды в день, в течение 2-3 дней.

При сильной диарее: 100 грамм на 2 л теплой воды (молока, ЗЦМ). Допускается дача до четырех раз в день, в зависимости от тяжести заболевания.

На 4-5 день – 50 грамм на 2 литра воды (молока, ЗЦМ) выпаивают дважды в день.

С профилактической целью: 10-20 грамм на 0,5-2 л теплой воды (молока, ЗЦМ) выпаивают дважды в день.

С профилактической целью ДиарГард может использоваться в течении длительного времени.

Поросятам:

При слабых признаках диареи: 5-10 грамм, предварительно размешав в 0,1-0,3 литра теплой воды (молока, ЗЦМ).

В случае сильной диареи доза может быть увеличена до 10-20 г.

С профилактической целью 5 грамм на голову предварительно размешав в теплой воде (молока, ЗЦМ)

8. Возможно скармливание в составе сухих кормов. Использовать 2-5 кг «ДиарГард» на 1 тонну корма.

9. При применении «ДиарГард» в рекомендуемых количествах побочных явлений и осложнений не отмечено. Противопоказаний к применению не установлено.

10. Премикс «ДиарГард» совместим со всеми ингредиентами корма, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.

11. Не содержит антибиотиков.

#### IV. Меры личной профилактики

11. При работе с «ДиарГард» следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, принятые при работе с кормами: не пить, не курить, не принимать пищу. Не допускать контакта добавки с кожей и глазами, использовать в помещениях с хорошей вентиляцией. Применять защитную одежду, перчатки ПВХ, защитные очки и индивидуальные средства защиты органов дыхания - защитную маску или респиратор.

12. Хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция по применению разработана ООО «АКА» (г. Москва)

Утверждаю

Генеральный директор ООО «АКА» Семендуев Э.С.

